

METAXOR

DÉBROUSSAILLANT EAJ

DÉBROUSSAILLANT SYSTEMIQUE ULTRA RAPIDE ET POLYVALENT

Emploi
autorisé en
jardin

► Agit sur de nombreux types de broussailles telles que les herbacées (prêle, ortie...), semi-ligneuses (chardons, ronce...) et ligneuses (ajonc, acacia, chêne...).

► Action systémique : rapidement absorbé par les feuilles, circule par la sève dans tout le végétal jusqu'à l'extrémité des racines pour assurer une destruction totale.

► S'utilise également pour la dévitalisation des souches d'arbres et la destruction de leurs rejets.

► Sélectif vis à vis des graminées : respecte le gazon, les prairies et les talus.

LIEUX D'UTILISATION

Destiné aux endroits où les broussailles doivent être détruites, telles que l'aménagement d'une ancienne friche, l'entretien de talus, les abords de bâtiments, de chemins, ...

DOSES D'HOMOLOGATION

Traitement généraux - dévitalisation des broussailles :
20 mL/L (soit 4ml/10m² de terrain maximum) – Application en traitement localisé sur les broussailles - 1 application maximum par an uniquement entre mars et octobre.

Traitement généraux - dévitalisation arbre sur pied-souches :
300 ml/L (soit 1L de bouillie/m² de section de souches) - 1 apport maximum par an.

PLANTES CIBLES	DOSE DE PRODUIT	VOLUME D'EAU
Ronces, Orties	10 ml	1 L soit 1 %
Bouleau, Eglantier, Trèfle	15 ml	1 L soit 1,5 %
Genêt, Ajoncs, Frêne, Robinier faux acacia, Bruyère, Liseron, Chardon	20 ml	1 L soit 2 %

Pour la dévitalisation des souches, mélanger 1/3 de produit dans 2/3 d'eau (300 ml de produit dans 700 ml d'eau).

PERIODE D'UTILISATION

■	Période optimum
■	Période possible
■	Période déconseillée

En débroussaillage :

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

En dévitalisation des souches :

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

MODE D'EMPLOI

Préparer la quantité de bouillie nécessaire en fonction de la végétation à traiter. Traiter à l'aide d'un pulvérisateur de façon localisée sur les broussailles. Pour la dévitalisation des souches, badigeonner au pinceau.

CONSEILS D'UTILISATION

Traiter de préférence en automne ou au printemps en dévitalisation des souches. Sur les broussailles développées (plantes pérennes et ligneuses), appliquer uniquement entre mars et octobre. Si les broussailles sont trop hautes, les couper à ras et attendre que les repousses atteignent 25 cm pour traiter et assurer leur destruction.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

pH : 9,1 (à 1 %).

Matières actives : Triclopyr 60 g/L (6 %p/p) sous forme de sel de triéthylamine + Fluroxypyr 20 g/L (2 % p/p) sous forme d'ester 1-méthylheptyl.

Formulation : Émulsion aqueuse (EW).

Type et mode d'action : Herbicide systémique.

Emploi autorisé dans les jardins.

NOM HOMOLOGUÉ : Evade Jardin AMM n°2120133 - Détenteur de l'AMM : DOW AGROSCIENCES S.A.S Dow AgroSciences S.A.S. 371, rue Ludwig Van Beethoven - 06560 Valbonne.

CONDITIONS D'EMPLOI

Consulter les précautions d'emploi sur l'emballage ou la FDS.

Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du produit autres que celles exprimées dans cette notice.

Distribution des produits phytopharmaceutiques : agrément HN01041.

FT 1020007220001-0216

Vous souhaitez une démonstration :
contactez votre commercial ou
appelez-nous au 02.32.96.93.93

Nos fiches de données de sécurité sont
disponibles 24h/24 sur Internet à
l'adresse : www.quickfds.com

www.purodor-marosam.com